

برنامه غذایی گوساله

بلافاصله پس از تولد، گوساله را با آغوز سالم و پاکیزه و دارای غلظت مناسب ایمونوگلوبین ها تغذیه و در چند ساعت اول این عمل را تکرار کنید به گونه ای که گوساله طی ۸ ساعت اول زندگی متناسب با وزن بدن ۶ تا ۸ لیتر آغوز دریافت کند.

طی ۲ تا ۳ روز پس از تولد گوساله، خوراندن آغوز و آغوز در حال تبدیل شدن به شیر را ادامه دهید. اطمینان حاصل کنید که گوساله در این ۳ روز حداکثر میزان آغوز را دریافت کرده است. به یاد داشته باشید که گوساله در چند روز اول پس از تولد بسیار ضعیف است و چون آغوز محتوی مقادیر بسیار زیادی آنتی بادی است با خوردن آغوز مقاومت گوساله بطور قابل توجهی در مقابل تهاجم میکروبهای بیماری را افزایش می یابد.

به دلیل کم بودن حجم شیردان، در هفته اول تولد بیش از ۱.۵ لیتر در وعده شیر به گوساله داده نشود.

آب سالم، تمیز و عاری از آلودگی باید از روز دوم در اختیار گوساله باشد.

یک ساعت قبل و دو ساعت بعد از شیردهی آب از دسترس گوساله خارج شود.

از ۴ الی ۵ روزگی کنسانتره استارتر به میزان کم به منظور آشنایی گوساله با آن در ظرفی تمیز در اختیار گوساله قرار داده شود.

استارتر باقیمانده از روز قبل را دور بریزید و استارتر جدید جایگزین آن کنید.

بتدریج و با افزایش مصرف، میزان استارتی که در سطل جلوی گوساله ریخته می-شود افزایش یابد.

برای شروع تغذیه با یونجه، از ۶ الی ۷ هفتگی روزانه به میزان ۱۰۰ گرم از یونجه کامل خرد شده با کیفیت بالا در اختیار گوساله قرار دهید.

در صورتیکه سه ماه به گوساله شیر می دهید، زمانی که گوساله روزانه ۲.۵ کیلو از مجموع کنسانتره و یونجه را بخورد، میتوان گوساله را از شیر گرفت. زمان شروع از شیرگیری، گوساله باید حداقل ۹۰ کیلو وزن داشته باشد.

از شیرگیری باید به تدریج و طی یک پروسه ۱۰ الی ۱۴ روزه انجام شود.